



KARNO LIVER

Complémentaire

Aliment complémentaire pour Volailles, Ruminants, Porcs et Lapins.

Composition :

Sel, Propylèneglycol

Constituants analytiques :

Humidité :	62.0 g/100 ml	Lysine :	0.00 g /100 ml
Protéine brute :	4.5 g /100 ml	Méthionine :	0.88 g /100 ml
Matières grasses brutes :	0.0 g /100 ml	Sodium :	1.29 g /100 ml
Cellulose brute :	0.0 g /100 ml		
Cendres brutes :	2.5 g /100 ml		

Additifs (/kg) :

VITAMINES /

3a890 Chlorure de Choline	20 440 mg
3a925 Bétaïne (Hydrochlorhydrate de bétaïne)	41 710 mg

ACIDES AMINES /

3c307 Hydroxy-analogue de la méthionine	10 000 mg
---	-----------

EMULSIFIANT-STABILISANTS-EPAISSANTS-GELIFIANTS /

E420 Sorbitol	250 000 mg
---------------	------------

CONSERVATEURS /

1k281 Propionate de sodium	20 000 mg
1a330 Acide citrique	10 000 mg

Mode d'emploi :

Truies : KARNO LIVER est utilisé en cure de une semaine 2 fois par an sur l'ensemble du troupeau à raison de 10-15 ml / animal / jour.

Poulet de chair / dinde : De J18 à J 25 et de J35 à J40, KARNO LIVER est incorporé à raison de 2 ml / Litre d'eau de boisson pendant 5 jours consécutifs au moment de la transition alimentaire.

Pondeuse : KARNO LIVER est utilisé en cure 1 fois par mois pendant 5 jours à raison de 2 ml / Litre d'eau de boisson.

Ruminants Bovins, Ovins et Caprins : KARNO LIVER est incorporé à raison de 10 ml pour 100 kg de poids vif pendant 3 à 5 jours.

Lapins : KARNO LIVER est utilisé en cure 1 fois par mois pendant 5 jours à raison de 1 ml / Litre d'eau de boisson.

Conserver dans un endroit sec à température ambiante (<25°C). Activité assurée pendant la durée de vie du produit. Garder le conditionnement fermé. Après ouverture, utiliser dans une courte période.

Selon l'espèce cible, il est recommandé de ne pas dépasser une teneur en chlorure de choline dans l'eau d'abreuvement.

Fabriqué par un site certifié OQUALIM-RCNA.

Fabriqué par un site certifié OQUALIM-STNO, convient aux filières "Nourri sans OGM < 0.9%".

L'utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu'un ou plusieurs d'entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.

Caractéristiques du produit et conditionnement :

Conditionnements : bidons, fûts, GRV.

Présentation : liquide.

Densité : 1.11 +/-0.07 g/cm3 (g/mL)

À utiliser de préférence dans les 24 mois qui suivent la date de fabrication.

pH indicatif à 20°C (liquide pur) : 4.3 +/-0.5

Conserver à l'abri de la lumière, dans un endroit sec et frais dans son emballage d'origine.

Ces données sont communiquées à titre indicatif et peuvent évoluer selon les sourcing des ingrédients

TESTINFOCOMPO